



## **Гексорал аэроз. 0,2% 40мл 4 насадки-распылителя (семейная уп)**

Производитель: Джонсон и Джонсон  
ООО/МакНил Мэньюфэкчуринг/Фамар Орлеан

**344.00 руб.**

### **Основная информация**

#### **1. Особые указания**

Специальных предписаний нет. Дети могут применять препарат с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого его проглатывания или когда они не сопротивляются постороннему предмету (аппликатору) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата. Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности.

#### **2. Передозировка**

Препарат в указанной дозировке не токсичен. Проглатывание больших количеств препарата приводит к рвоте, поэтому значительного всасывания не ожидается. При любых случаях передозировки следует немедленно проконсультироваться с врачом. Промывание желудка необходимо в течение 2 ч после проглатывания избыточной дозы.

#### **3. Побочные эффекты**

В отдельных случаях развивались реакции повышенной чувствительности к препарату. При длительном применении возможно нарушение вкуса.

#### **4. Противопоказания**

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; детский возраст (до 3 лет).

#### **5. Фармакологическое действие**

Фармакологическое действие - дезодорирующее, антисептическое, обволакивающее, гемостатическое, противогрибковое, анальгезирующее.

#### **6. Показания к применению**

Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки; тяжелые, сопровождающиеся лихорадкой или гнойные заболевания полости рта и глотки, требующие назначения антибиотиков и сульфаниламидов, тонзиллит (в составе комплексной терапии); ангины (в т.ч. ангины с поражением боковых валиков, ангина Плаут-Винцента); фарингит; гингивит и кровоточивость десен; периодонтопатии (заболевания периодонта и их симптомы); стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), афтозные язвы (болезненное воспаление с

поверхностными дефектами тканей) — с целью профилактики суперинфекций; инфицирование альвеол (лунок зубов) после удаления зубов; грибковые инфекции полости рта и глотки, особенно кандидозный стоматит (молочница); до и после операций в полости рта и глотки; дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях; устранение неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей полости рта и глотки; вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний.